딕골드

제4종복합비료 · 엽면시비용

DIG GOLD SOLUTION

작물에 필요한 영양
균형 있는 생육으로

동물성 아미노산과 천연 복합효소제를 활용해 작물에 필요한 영양을 공급하는 제4종복합비료입니다.



영양을 살피고 생육을 돕습니다

500 mL · 1 L · 4 L

NONGBI

균형 있는 영양
세심한 생육 관리

제품을 만드는 다섯 가지 관점

동물성 아미노산과 천연 복합효소제를 활용해 영양 공급과 토양환경을 함께 고려합니다.

복합미생물	Bacillus 계열 등 자체 배양 · 복합미생물 소재를 활용합니다.
양분순환	유기물 분해 · 인산 가용화 · 질소순환을 고려합니다.
뿌리 활력	근권 미생물과 대사산물로 뿌리 주변 환경을 살핍니다.
토양환경	유기물 분해와 입단 형성에 관여하는 미생물을 활용합니다.
생육 보조성분	천연 유래 옥신 · 동물성 아미노산 · 목초액 · 부식질 유사물질과 다량 · 미량 영양소를 활용합니다.

비료생산업자 보증표

5%
질소전량

2%
수용성 인산

4%
수용성 칼리

수용성 붕소 0.05%
비료 종류 제4종복합비료(엽면시비용)
비료생산업 등록번호 울산 남020-가-10404

수용성 몰리브덴 0.0005%
기타성분 아미노산 18종
정미중량 제품별 표기

제품 표시사항에 따른 보증성분입니다.

살아 있는 토양환경

미생물은 유기물을 분해하고 양분을 순환시키며 뿌리 주변 환경을 만듭니다.
농비는 미생물의 종류뿐 아니라 미생물이 활동하는 토양환경까지 함께 살핍니다.

기본 희석과 반복 사용

기본 희석	어린 묘 1,000배 · 성목 500배. 생육 상태에 맞춰 사용.
반복 사용	첫 사용 후 생육 상태에 따라 7~10일 간격으로 사용.

토양검정 → 양분관리 → 미생물 환경 → 뿌리 활력 → 작물 생육

작물의 영양과 토양의 생명력을 함께 살핍니다.

작물과 생육 단계에 맞게

관주 · 엽면살포와 침지

관주 · 엽면살포	제품 1 L / 1,000 m² · 기본 500배 희석.
종자침지	벼 · 콩 · 옥수수 · 마늘 · 생강 · 감자 · 고구마 등: 100~200배액에 약 30분 침지 후 파종.
모종침지	뿌리 중심 200배 · 모종 전체 1,000배.

모종침지: 양파 · 파 · 옥수수 · 고추 등. 종자침지는 수수에도 적용합니다. 제품 표시사항과 제조사 안내를 따르십시오.

작물별 사용 기준

작물	제품량	횟수	사용 시기
부추 · 배추 · 상추 · 미나리 · 곤드레 · 취나물 등	**1 L**	**4~5회**	생육 초기부터 수확기까지
고추 · 딸기 · 오이 · 수박 · 참외 · 토마토 · 멜론 · 호박 등	**1 L**	**7~8회**	생육 초기 · 개화기 · 매 수확 시
감 · 감귤 · 사과 · 배 · 포도 · 매실 · 블루베리 등	**1 L**	**4~5회 · 감 2~3회**	생육 초기부터 수확 30일 전까지 / 개화기에는 가급적 사용을 자제하십시오.
파 · 양파 · 마늘 · 감자 · 고구마 · 당근 · 무 · 울금 등	**1 L**	**2~3회**	이식 10일 후부터 전 생육 기간
벼 · 보리 · 밀 · 옥수수 · 콩 · 팥 · 조 · 수수 등	**1.5 L**	**2~3회**	생육 초기 · 개화기 · 개화 10일 후
구기자 · 참깨 · 들깨 · 유채 · 땅콩 · 작약 · 황기 등	**1 L**	**2~3회**	이식 10일 후부터 전 생육 기간
인삼 · 더덕 · 마 · 생강	**1 L**	**재배 조건별 상담**	정식 10일 후부터
대나무 · 소나무 · 잔디 등	**1 L**	**재배 조건별 상담**	전 생육 기간

1,000 m² 기준 · 500~1,000배 희석. 제품량은 희석 전 원액량입니다.

딕골드

자원의 가치를 땅의 생명으로

제품 분류

제4종 복합비료(엽면시비용)

보증 성분

질소 전량 5% **수용성 인산 2%**
수용성 칼리 4% **수용성 붕소 0.05%**
수용성 몰리브덴 0.0005%

농협 계통계약 상품코드(바코드)

500 mL	880030780035
1,000 mL	880030780042
4,000 mL	880030780059

생산물배상책임보험 가입

사용 시 주의사항

표준 사용량과 품종 · 재배법을 고려하십시오. 농약 혼용 전 혼용표를 확인하고 침전물이 섞이도록 2~3회 흔들어 사용하십시오.

농가가 전하는 현장의 경험

오이 · 경북 의성

냉해 후 1,000배액을 기존 양액과 혼용해 주 1회씩 3회 관주. 농가는 새 뿌리의 활력과 이후 정상 수확을 관찰했습니다.

양파 · 감자 · 상주

현장 시험에서 별도 농약 방제 없이 진딧물 발생 감소가 관찰되었습니다.

다양한 작물

500~1,000배 관주 · 엽면살포 후 잎과 뿌리의 활력, 생육 상태에 대한 긍정적인 농가 의견이 있었습니다.

농비 제품 사용 농가의 관찰로 사례별 제품은 구분되지 않았습니다. 효과를 입증하는 비교시험은 아니며 결과는 재배 환경에 따라 다릅니다.



주식회사 농 비
NONGBI Co.,Ltd.

제조원 주식회사 농비

44782 울산광역시 남구 용잠로 583-87

T. 052-257-8090 · F. 052-257-8288
www.nongbi.co.kr